observations envoyés à l'academie royale de chirugie le 5 xbre 1770 par le sieur lasnier desbarre lieutenant de mr le premier chirugien du roy de la ville de gueret en marche.

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

le 26 novembre 1770 la nommé marie martin, epouse du nommé gadeau, cloutrier De cette ville, accoucha d'une fille à terme, et vivante laquellenfant avoit un vice De conformation si considerable, que la femme sage qui l'a receut en fut emu, cequi fit quaussitot aprés sa naissance je fus envoyé chercher de la part du pere; je trouvai l'enfant vivant mais daus un etat à me faire assurer à tous les assistans quelle ne tarderoit à mourir, je lui remarquai une tumeur De la grosseur des deux poingts située à la region epigastrique moyenne, commencant au cartilage siphoide et finissant audessous de l'ombilique: cette tumeur etoit tout-a-fait hors de l'abdomêne et etoit mobile De maniere à pouvoir se renverser sur la poitrine; le cordon etoit situé à la partie superieure et laterale gauche de la tumeur; ~~elle~~ qui n'etoit recouverte que par le peritoine qui lui servoit d'enveloppe, et me paru etre une tumeur herniere. toute l'etendüe de la face superieure et anterieure de cette tumeur etoit de couleur d'un rouge brun, ayant vu que l'enfant etoit presque agonisant, je priai le pere, qu'aprés la mort de son enfant il me permit de l'examiner et de m'assurer de cequi formoit cette tumeur, ce quil m'accorda. environ deux heures aprés, l'enfant etant decedé, ~~je~~ je fus averti, et me rendis aussitot chez lui accompagné du sieur cusiné l'un de mes confreres. nous examinames le cadavre en presence de la femme sage, nous trouvames ainsi que je l'ai deja dit une tumeur de la grosseur des deux poingts ayant pour enveloppe le peritoine, dont toute la face anterieure etoit d'un rouge brun, et la face posterieure De la couleur ordinaire du peritoine, lequel peritoine etait transparant nous laissoit voir les circonvolutions des intestins qui etoient contenus dans la tumeur, le cordon etoit à la partie superieure et laterale gauche de cette tumeur. toute l'etendue de l'abdomene etoit recouvert des muscles et de la peau naturelle, si ce n'est dans le lieu de la tumeur, ou il y avoit une intervalle en ovale, de la grandeur environ d'un ecu de six francs et demi, le sac de la tumeur sevarant exterieurerement sur la peau nous pincames l'enveloppe de la tumeur, et ji fis une petite incision par le moyen de laquelle je paissai une sonde chrenelée depuis le bas de la tumeur, jusqua sa partie superieure, et fis une seconde ouverture en travers, nous trouvames que le foie en son entier formoit le dessus de la tumeur, et que c'etoit lui qui pretoit sa couleur au peritoine qui le couvroit, que pardessous ce viscere etoit l'estomach entierement vuide et que touts les intestins à l'exception de la partie ~~de l~~ inferieure du colum ~~l'ilium~~ etoient situés dans la Dite tumeur. ~~l'ilion~~ et le colum alloit dans la partie inferieure du bas ventre pour suivre son trajet avec le rectum qui etoit placé à l'ordinaire la rate etoit situeé dans sa place ordinaire: toute l'etendüe de l'abdomene etoit tapissée par le peritoine qui nous ~~p~~ pl paru etre beaucoup plus epais que dans l'etat ordinaire, les reins n'etoient point visibles, il fallut pour les decouvrir fendre le peritoine qui les couvroit. la matrice et ses ligamens etoit situe à l'ordinaire, nous trouvames que le cordon ombilical n'etoit composé que de la veine ombilicale qui se terminoit à la fisure du foie, et de là à la veine porte, et des deux arteres qui partoient des iliaques selon l'ordre naturel, nous n'avons point pu decouvrir l'ouraque nous fumes convaincus que ces parties ne s'etoient pas deplacées accidentellement, mais qu'aucontraire ce vice de conformation etoit naturel et tiroit son origine Des premiers moments de la conformation, nous fimes l'ouverture de la poitrine pour voir si nous n'y decouvririons point quelques particularités, nous trovames que tous les visceres etoient bien conformés et situés selon l'ordre naturel.

ARC 14 d. 32 n° 1

No: 27

ARC 14 d 32